



20 TASAK INSTANT GRANULÁTUM

magn^eXPRESS[®]

FORTE

Magnesium 400 mg + B₆-vitamin

MagnExpress Forte magnéziumtartalmú citromlé ízesítő-kiegészítő granulátum édesítőszerrel

A MagnExpress Forte granulátum egy adagja 400 mg elemi magnéziumot tartalmaz. A magnézium hozzájárul a normál izomműködéshez és az idegrendszer megfelelő működéséhez.

Adagolás: Napi 1 tasak fogyasztása javasolt! A tasak tartalma minimum 250 ml vízben feloldva fogyasztandó. Várja meg, amíg az oldat áttetszővé válik. A termék izomlót tartalmaz, túlzott fogyasztása hashajtó hatású lehet. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot! A termék gyermekek elől gondosan elzárva tartandó!

Működését megkönnyíti / Gyógyászati szám: a doboz alján jelzett időpontig. Száraz, hűvös, erős napfénytől védett helyen tárolandó.

Forgalmazza: Innopharm Gyógyszergyártó Kft.,
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21.
☎ Infóvonal: +36 1 239 8361
✉ E-mail: office@innopharmkft.hu
🌐 Web: www.innopharmkft.hu
Szármarzási hely: EU



20 TASAK INSTANT GRANULÁTUM

magn^eXPRESS[®]

FORTE

Magnesium 400 mg + B₆-vitamin

MagnExpress Forte magnéziumtartalmú citromlé ízesítő-kiegészítő granulátum édesítőszerrel

Összetevők: savanyúságot szabályozó anyag (citromsav, trinátrium-citrát), trimagnézium-citrát, magnézium-karbonát, édesítőszer (izomalt, nátrium-ciklamát, nátrium-szacharin), citrom aroma, piridoxin-hidroklorid.

Aktív összetevő-tartalom
1 tasakban:

Magnézium: 400 mg
(*NRV 107%-a)

B₆-vitamin: 1,4 mg
(*NRV 100%-a)

(*NRV-napi táplálkozási
beviteli referenciaérték
felőttek esetében)

Nettó tömeg: 114 g
(20 x 5,7 g-os tasak)

Tápanyagok 1 tasakban:

Energia	53,24 kJ / 12,31 kcal
Zsír	0 g
amelyből	
telített zsírsavak	0 g
Szénhidrát	0,18 g
amelyből cukrok	0 g
amelyből poliolok	0,13 g
Rost	0 g
Fehérje	0 g
Só	0,03 g



20 TASAK INSTANT GRANULÁTUM

magn^eXPRESS[®]

FORTE

Magnesium

400 mg

+ B₆-vitamin




20 TASAK INSTANT GRANULÁTUM

magn^eXPRESS[®]

FORTE

Magnesium 400 mg + B₆-vitamin



A magnéziumszint jelentős csökkenésének következménye lehet hányinger, izomgyengeség, letargia és szédülés.

(FAO/WHO Joint Report on Human Vitamin and Mineral Requirements, 2001, 223-224.)

